Mr. Robin

Observation 19. d'une hydropisie enkystée de l'ovaire gauche.

Le 17. du mois de May dernier, je fus appellé à l'hospice de St. andré des arcs, pour y faire l'opération de la paracenthèse, ~~conseillée par Mr. Dubois Medecin~~, à une femme agée d'environ 35. ans. Le Volume du Ventre étoit considérable. La Nécessité de l'opération n'étoit par équivoque; je tirai dix huit pintes d'eau mesurée, de couleur verte foncée, comme une huile très epaisse et d'une mauvaise odeur. après l'opération je sentis comme une tumeur Schirreuse du volume d'environ un pain d'une demie livre, situé dans la partie supérieure de l'hipocondre gauche; que je soupçonnai être un Schirre de la Rate, qui, par son volume pouvoit être descendüe plus basse que dans son état naturel.

Le 3. Juillet suivant je réitérai la même operation et la fis à peu de distance de la 1.ere j'en tirai presque autant d'un fluide, non de la même couleur de la 1.ere ponction; mais comme un vrai fluide purulent et d'une plus mauvaise odeur.

Le 27. du même mois je fis une 3.e ponction, encore près des precedentes, il sortit comme à la 2.e un fluide purulent et d'une odeur encore plus désagréable: Lorsque j'eus tiré environ 9. pintes de ce fluide, il cessa tout a coup de continuer à sortir, malgré qu'il parut en rester encore autant. J'introduisis un stilet dans la Canule, je ne sentis rien à son extremité qui causat obstacle à la sortie du même fluide; mais

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n° 80

en poussant un peu au delà, je sentis quelque chose qui fuioit à la pression légere de mon stilet, et comme la Malade étoit foible et desespérée, je retirai la canule et priai les sœurs de m'avertir lorsque la malade seroit défunte.

Le 15. du Courant je fus averti que la femme étoit morte de la veille. Je me transportai à l'hospice. J'examinai ~~l~~ l'extérieur du sujet; le ventre étoit énorme et aussi volumineux qu'il l'étoit lors de la 1.ere ponction. Les aines et le pénil etoient livides et parsemés de crevasses; la pointe du cartilage xiphoïde tout à fait relevée en dehors.

Pour me débarrasser du fluide contenu dans l'abdomen, à cause de son abondance et de sa mauvaise odeur, je fis une ouverture assés grande du côté de l'hipocondre gauche à la faveur de laquelle je reçus, dans un grand vase, au moins dix huit pintes de fluide purulent, semblable à celui des deux dernieres ponctions.

Ensuite, pour venir à l'Examen des viscères contenus dans le Bas-ventre, je commencai ~~une~~ incision à la partie supérieure de la région Epigastrique: l'abdomen ouvert, de la longueur d'environ deux pouces, j'introduisis les doigts index et medius d'une main pour prolonger de l'autre avec mon ~~stilet~~ scapel l'ouverture entiere du Bas ventre: Etant tout au plus parvenu à la partie moyenne de la région Epigastrique, je sentis que le Péritoine étoit adhérent à ~~toute la surface du~~ ~~Péritoine~~ quelques parties contenües dans l'abdomen; ayant prolongé l'ouverture avec ménagement jusqu'au Pubis, je me suis apperçu qu'un sac ou poche, d'un diametre considérable, étoit adhérent à toute la surface du Péritoine depuis le milieu de la Région Epigastrique jusqu'à la circonférance du Bassin; de sorte que tout le paquet intestinal et le ventricule se trouvaient logés dans la partie supérieure des Régions

Epigastrique et de l'un et l'autre hypocondres.
Je n'ai trouvé aucun épanchement dans le ventre;
tout le fluide étoit contenu dans la poche susditte,
que j'ai décolée du péritoine en détruisant aussi de
fortes brides qui l'atachoient aux vertebres et aux
parties environnantes, tels que aux gros vaisseaux
aux ureteres, à la vessie et au rectum. Il n'i avoit nul
adhérence avec les autres intestins n'i avec l'Epiploon.
Tous les visceres étoient dans le meilleur état; cependant
depuis environ trois mois les extremités inferieures
étoient très infiltrées ce qui devoit dépendre de la
pression que faisoit la tumeur sur les gros vaisseaux.
J'ai commencé par examiner les endroits du sac où
j'avois fait mes ponctions, je me suis apperçu que
la derniere ouverture et un peu de sa circonférence s'étoit
détachés de ses adhérences avec le péritoine, de sorte que
le kiste vuide environ de moitié a quitté la canule et
s'en est éloigné; c'est ce qui a été la cause de la cessation
de l'écoulement du fluide contenu, à la moitié de ma
derniere opération, et l'ouverture s'étoit assés resserrée
pour ne rien laisser ~~echapper~~ épancher dans l'abdomen de
de ce qui restoit dans ce grand kiste.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Cette piece, quoique la 2e. de cette nature que j'ai
l'honneur de soumettre aux yeux de l'academie, m'a
parüe mériter son attention. Elle observera une
tumeur assés volumineuse et comme squirreuse faisant
partie des parois de ce kiste d'un si grand diametre,
étoit ce que j'avois pris pour la Rate, à l'examen fait
après la 1ere ponction. L'academie reconnoîtra que ce
kiste n'est qu'une dilatation de l'ovaire gauche. +
La Matrice est dans l'état naturel.
Je joins aussi ici les informations que j'ai prises
du commencement de la Maladie de la femme.
Il y avoit 22 mois lorsque cette femme est venue à
l'office qu'elle ~~étoit~~ accouchée très heureusement d'un garçon
pour 2d. Enfant. Depuis son accouchement elle n'a

+ Ce que j'avois senti de squirreux et qui faisoit partie des parois du kiste
n'est qu'une réunion de plusieurs hydatides, les unes remplies de serosité,
contenant un fluide gelatineux

point été reglée. Le 3e. jour de ses couches Elle fut effrayée par le bruit du Tonnerre. Et le Lendemain autre effroi de la chute d'un plancher: Dès ce moment les lochies ont été supprimées et rien n'a reparu depuis.

Le 7. ou 8e. jour étant chez ~~un~~ boulanger (parceque par état et indigence, Elle se relevoit promptement) l'aspect d'un Commissaire et de sa suite qui se presenterent subitement à l'effet de faire une saisie l'effraya encore.

Au bout de 4. ou 5. mois, relativement à l'absence de ses regles, et au volume de son ventre, elle se soupçonna grosse.

Parvenüe au terme de neuf mois, son ventre continua a augmenter de plus en plus, Elle communiqua ses inquietudes a quelques Personnes.

vers le 10. ou 11e mois elle a consulté un Nommé Mr. Berut Chirurgien rue Guenegot, qui lui a fait prendre pendant environ six semaines d'une infusion d'Ecorce de sureau dans du vin blanc, sans aucun succès.

vers le 13e. ou 14e. mois Elle a été Consulter Mr. Goubelly Med. de la faculté, qui lui a assuré qu'elle n'etoit point grosse, ce qui n'etoit pas difficile a prononcer, et sans lui ~~[illegible]~~ rien Conseiller la remit à 15. jours pour revenir le revoir, Elle n'y a pas retourné.

vers le 17. ou 18e. mois Elle ~~a été~~ fut vüe et examinée par Mr.   Chirurgien rue de Seve faub. St. Germain qui lui promit de la guerir: Il la traitée pendant quelques semaines sans aucun succès.

~~[illegible]~~ C'est lorsque le ventre de cette femme a été parvenu au volume de lui empêcher de marcher qu'elle a été recue à l'hospice. Cette femme a presque toujours continué son état de Marchande Rotisseuse à la Valée. Elle demeuroit rue de Nevers et se nommoit andré

ce Jeudy 19. aoust 1784. Robin